Автор: Administrator
10.10.2011 08:31



При остром заболевании животные отказываются от корма, у них шаткая походка, они больше лежат в зарослях, отстают от стада, держатся отдельно. Тяжелобольные звери не уходят от опасности, иногда у них бывает рвота, а у хищных животных — и воспаление слизистой оболочки глаз, слюнотечение, слабость зада, нередко понос. Шерсть возле ануса выпачкана калом, отмечается непроизвольное выделение мочи. Животные погибают через 3—5 дней в полудремотном состоянии.

При отягощении болезни звери находятся в угнетенном состоянии, их шерсть теряет блеск, волосы возле ануса загрязнены фекалиями, походка шаткая, движения стеснены, звери как бы садятся на зад; у хищных животных наблюдается желтуха; у бобров также отмечается желтушность, но редко. Животные погибают при резко выраженном истощении. Смерть наступает спустя 7—10 суток с момента заболевания, иногда позже. Чаще погибают молодые животные.

В случае хронического заболевания наблюдается прогрессирующее исхудание, самка рожает преждевременно за несколько дней до нормальных родов. У больных наступают перемеживающиеся поносы, звери больше лежат в берлогах, чаще попадаются на глаза охотникам. У абортировавшихся самок появляются метриты, серозно-гнойное воспаление глаз, иногда катарально-гнойные выделения из носа.