



Пастереллез у диких животных всегда протекает остро — животные погибают через 1—5 суток с момента появления признаков болезни.

У трупов иногда обнаруживают отеки на подгрудке, на шее, в области заглотки и на голове. При снятии кожи в подкожной клетчатке на местах отеков видны студенисто-кровянистые желтые инфильтраты и местами точечные и пятнистые кровоизлияния. Наблюдаются отек нёба, гортани, точечные и пятнистые кровоизлияния на слизистой неба, глотки, гортани, трахеи, на легочной и пристеночной плевре; в легких — красно-желтоватые очаги — фибринозно-геморрагическое воспаление. В грудной клетке желтовато-кровянистый экссудат. Сердце дряблое, его мышца как бы вареная. Под эпикардом и эндокардом — точечные и пятнистые кровоизлияния.

В полостях сердца рыхлые сгустки крови. Печень кровенаполнена, увеличена; селезенка увеличена, кровенаполнена, под капсулой ее множественные кровоизлияния, на разрезе она дряблая; пульпа темно-красного цвета. Почки темно-красные, застойные. В корковом слое почек, на стенках почечных лоханок, на слизистых оболочках желудка, кишок и мочевого пузыря — точечные и пятнистые кровоизлияния.

У птиц, особенно отряда гусеобразных, на слизистой оболочке кишечника диффузное геморрагическое воспаление и образование язв. В скелетной мускулатуре инфильтраты и кровоизлияния. Лимфатические узлы скелетной мускулатуры и внутренних органов темно-красного цвета, жировая клетчатка вокруг них пропитана желто-красноватым

Автор: Administrator
11.09.2011 00:00

инфильтратом с массой мелких кровоизлияний.