



Туляремия—заболевание многих видов животных. Поражает лимфатические узлы, селезенку и другие внутренние органы, образуя мертвые клетки ткани в виде желтовато-серых очажков. У людей при этом заболевании наблюдаются увеличение и омертвление околоушных лимфатических узлов.

Возбудителем туляремии являются бактерии туляренсе — маленькие с закругленными концами палочки. Восприимчивы к туляремии суслики, крысы, мыши, ондатра, зайцы, кролики, нутрия, бобр, чаще канадский; бывает у лисицы, енота, норки, хорька, горностая, ласки. Люди заражаются этой болезнью при снятии шкур с павших пушных животных. Всего к туляремии восприимчиво более 40 видов животных. Заболевание занесено из Калифорнии пушными зверями.

Заражение в природе происходит от поедания животными трупов зверей, погибших от туляремии, а также переносится блохами, комарами, клещами, слепнями и другими насекомыми.

Попав в организм, возбудитель вначале гнездится в месте его внедрения, вызывая здесь воспаление и омертвление ткани. Затем бактерии по лимфатическим сосудам с лимфой проникают в кровь, разносятся по всему организму и вызывают септицемию (бактериемию).

Различают острое, подострое и хроническое течение болезни. При остром течении животные очень угнетены, теряют аппетит, не уходят от опасности. У них шаткая походка, они больше лежат в логове, норах. У бобров заметны увеличение

Автор: Administrator
22.07.2011 18:48

поверхностных лимфоузлов, гиперемия — покраснение слизистой оболочки глаз, серознослизистое выделение из носа. Иногда наблюдается воспаление легких, особенно у животных, живущих семьями в гнездах, выстланных соломой, сухой травой или сухими листьями. При воспалении легких из носа выделяется слизисто-гнойное истечение неприятного запаха. Отмечается понос.