



Верх головы серый. На лицевой части резко выраженная черная или почти черная (буроватая) «маска» в виде большого пятна, начинающегося на щеках и тянущегося, расширяясь, через глаза на морду. По верхней поверхности морды оно простирается до нижней части носа и дает узкий мыс, который тянется назад на лоб. Иногда полоса, идущая вдоль морды, несколько отделена легким посветлением от глазничных пятен.

Лицевая маска ограничена хорошо выраженными белыми полосами, окаймляющими ее сверху и протягивающимися вдоль нее кзади под ушами и на бока шеи. Боковые части мордочки, губы, подбородок и нижняя поверхность нижней челюсти белые. На горле поперечное черное или бурое поле, отделенное от темного узора маски узкой белой полосой, которая тянется от мордочки кзади. Уши одеты короткими сероватыми или буроватыми волосами и несут у основания задней поверхности изменчивые по величине и резкости небольшие черные пятна.

Наравне с енотами описанной нормальной окраски встречаются черные (меланисты).

Автор: Administrator
25.12.2010 22:35

Одна линька в году. Лицевой отдел черепа короткий и довольно широкий. Мозговая коробка объемистая, сзади заметно вздутая, в межскуловой области длинная и широкая, с почти параллельными границами. Лицевая длина черепа меньше мозговой. Носовые кости короткие и довольно широкие. Линия верхнего профиля черепа выпуклая — наиболее высока лобная область, от которой линия профиля полого спускается как кзади, так и кпереди. Надглазничные отростки выражены очень слабо, лобная поверхность между ними продольно несколько вогнутая. Мастоидные отростки большие, паракципитальные развиты умеренно. Твердое небо заходит за конец зубного ряда приблизительно на 1/3 общей длины неба. Слуховые барабаны округлой формы, вздутые. Сагиттальный гребень выражен слабо, затылочный — хорошо. Клыки относительно недлинные, верхние почти прямые, нижние заметно изогнутые. Четвертый предкоренной и первый коренной верхней челюсти почти равны между собой (коренной немного больше), второй коренной приблизительно вдвое меньше первого. Первый и второй нижние коренные почти равны по величине.

Длина тела самцов 435—545 мм, самок 410—570 мм; длина хвоста самцов 200—405 мм, самок 192—340 мм; длина задней ступни (с когтем) самцов 96—138 мм, самок 83—129 мм.

Кондилобазальная длина черепа самцов 94,3—125,8 мм, самок 89,4—115,9 мм; скуловая ширина самцов 60,2—89,1 мм, самок 58,3—81,2 мм.

Вес в разное время года, особенно в связи с накоплением жира перед зимним сном, изменяется очень сильно — от 5,4 и до 15,75 кг и даже может достигать 22,2 кг г.