

С 1951 г. все выпущенные звери, кроме 16 черных енотов, были пойманы в Закатало-Нухинской долине Азербайджана (Н. Н. Руковский).

В 1954 г. 486 енотов (Абрамов, 1961), пойманных в Закавказье, были выпущены в Партизанском, Анучинском и Яковлевском районах Приморского края. Выпуски были осуществлены в хвойно-широколиственных лесах в долины горно-таежных речек. В этих лесах, сильно затронутых рубками и лесными пожарами, было мало дуплистых деревьев, а кормовые ресурсы оказались недостаточными.

Еноты перешли в низменности, но и там дупел оказалось мало, и еноты селились в норах, расселинах скал и стогах сена. Не сумев накопить к зиме жир, они плохо перенесли зиму (продолжительность ее 120—150 дней) с суровыми морозами. Были случаи гибели от голода и морозов. В последующие годы численность всюду была ниже, чем в год выпуска. Размножение имело место, но смертность превышала его. К 60-м годам в Приморье еноты вымерли.

В Краснодарском крае (Котов и Рябов, 1963) еноты расселились на неширокой полосе площадью около 7000 км² на пространстве от Новороссийска до Лазаревской. Здесь они всюду встречаются спорадически и при невысокой плотности. В лучших участках — в Горяче-Ключинском районе — 3,5 зверя на 1000 га, в Геленджикском районе — 0,6, в Лазаревском районе — 0,1. В лучших угодьях Исмаиллинского района плотность его достигала более 20,0 зверей на 1000 га (Руковский, 1951).