

(*Wyctereutes procyonoides* Gray)

Енотовидная собака, обитающая на Северо-западе России, характеризуется довольно крупными размерами тела и черепа и относится к подвиду *N. p. ussariensis* Matsthiе. Половые различия в весе и размерах животных выражены не очень отчетливо, однако в среднем самцы несколько крупнее самок. Очень велики сезонные изменения веса тела енотовидных собак за счет накопления ими к осени жировых запасов. Если весной и в начале лета вес взрослых зверей (старше года) равен 3.5—4.5 кг, то к сентябрю—ноябрю достигает 6—8 (и более) кг, т. е. почти удваивается.

Распространение, численность, стадияльное распределение. Первая попытка интродукции енотовидной собаки на Северо-западе России относится к 1935 г., когда в Мурманской обл. (нижнее течение р. Умба, Терский район) было выпущено 15 пар зверей, взятых из Городищенского зверосовхоза. Однако из-за скудности кормовой базы и сурового климата все они вскоре погибли, и в настоящее время енотовидная собака на Кольском п-ове не встречается.

В том же 1935 г. енотовидных собак завезли в Новгородскую обл. В количестве 25 пар их выпустили в Старорусском районе, в междуречье рр. Ловати и Поли. Акклиматизация животных прошла успешно, и уже к 1939 г. енотовидную собаку встречали в Поддорском, Демянском и Крестецком районах. К середине 40-х годов она заселила все пригодные для обитания уголья, а к концу десятилетия стала одним из основных объектов пушного промысла в области.