



В областях со снежными, холодными зимами еноту, как и бурому медведю и барсуку, свойствен зимний сон. В Закавказье (Руковский, 1951) в связи с теплой зимой и непродолжительными морозами активность енотов прекращается лишь с выпадением снега. Они выходят, когда почва частично освобождается от снега.

В Киргизии и Канаде, где снег лежит более длительное время, еноты покидают свои убежища ранее, чем весной сойдет снег. В Канаде их сон длится около 4 месяцев в году. Здесь они способны переносить в дуплах температуру наружного воздуха до  $-43^{\circ}\text{C}$ .

Сезонные миграции, заходы. После выпуска в штате Арканзас 250 енотов из Огайо отмечены случаи ухода от места выпуска за 37, 75 и 255 км (Баттерфильд, 1944).

Размножение. В Канаде, т. е. в северных частях ареала в Америке, течка бывает в марте. У годовалых самок течка происходит в мае — июне. В штате Нью-Йорк еноты спариваются в конце января — начале февраля (Мак Кивер, 1958). В штате Мичиган большинство самок спаривается в феврале — начале марта, а немногие из них — в конце марта; в штате Виргиния в отдельных случаях спаривание наблюдалось в начале июня.

В штатах Флорида и Джорджия сезон размножения длится с 10 февраля до 3 августа: в феврале спаривается 14% самок, в марте — 41%, в мае — 12%, в июне—12%, в июле —12%, в августе — 6% (Люэллин, 1953).